

IMPORTANCIA DE UNA BUENA DESINFECCIÓN DEL OMBLIGO

Jesus javier perez paniagua

CORDON UMBILICAL

- 1.- FORMACION.
 - ▣ - 2 ARTERIAS UMBILICALES
 - ▣ - UNA VENA UMBILICAL

- 2.- FUNCION
 - ▣ RESPIRATORIA
 - ▣ NUTRITIVA
 - ▣ EXCRETORA: a través del uraco que mantiene comunicación entre la vejiga y la cavidad alantoidea.

momento del parto

- Momento delicado:
 - ▣ Separacion del resto, buscando aislarse.
 - ▣ Orina con mayor frecuencia
 - ▣ Levanta el rabo.
 - ▣ movimientos de intranquilidad con las extremidades posteriores.
 - ▣ Contracciones abdominales
- Disponer de la superficie adecuada de alojamiento.
- Suelo bien encamado.
- Atencion en la distancia. Manipulacion si se ha demorado en el tiempo o sospechamos de que algo no va bien.

Material necesario

- Yodo o solución desinfectante.
- Spray con oxitetraciclina.
- Selenio y vitamina E
- Crotales de identificación, pintura, etc.
- Libreta de partos
- Solución de antibiótico

Cuidados neonatales

- Desinfección del ombligo
 - ▣ Lo mas rápido posible
 - ▣ Aplicación por fuera y por dentro
 - ▣ Usar productos que desinfecten y que a la vez sequen rápidamente**
- Encalostrado
 - ▣ Abrir el canal del pezón
 - ▣ Desechar los primeros chorros
 - ▣ Comprobar su aspecto (coloración, viscosidad)
 - ▣ Administrar no menos de 150 ml., 500 ml. en las primeras 24 horas.

MALA DESINFECCIÓN

- ONFALITIS: inflamación del ombligo
 - ▣ EXTRAUMBILICALES u ombligueras
 - Las que vemos a simple vista
 - Caliente
 - Inflamado
 - Mas abultado de lo normal, forma de cordón engrosado, a veces de tamaño de nuez.
 - A veces fistuliza con salida de material purulento.
 - El pronostico suele ser bueno, si se establece tratamiento rápido.
 - suele responder bien a desinfección y antibioterapia local y general

MALA DESINFECCIÓN

□ ONFALITIS.

▣ Intraumbilicales.-

- Dependiendo de la vía que afecten dan lugar a onfaloartritis, onfaloflebitis, sepsis del uraco
- No son visibles.
- Se pueden sospechar : Febriles, no maman bien, encogidos, no demuestran diarrea
- Gérmenes implicados: E. coli, Arc. Piogenes, Streptococos, etc.
- Suelen afectar a hígado provocando abscesos hepáticos al estar comunicado con la vena umbilical y desarrollar necrobacilosis.
- Otras veces se dirigen a vejiga por infección del uraco.
- Muy mal pronóstico, responden muy mal a terapia antibiótica .
- Los procesos que se cronifican, después de varios tratamientos antibióticos suelen terminar en poliartritis causando claudicación, mal desarrollo y al final terminamos sacrificándolos.

MALA DESINFECCIÓN

- HERNIAS UMBILICALES.
 - ▣ Heredabilidad
 - ▣ Partos laboriosos, desprendimientos en la línea alba.
 - ▣ Generalmente no es visible en los primeros días.
 - ▣ Esta teniendo una relevancia manifiesta en los establos en los que se utiliza la lactancia artificial:
 - Mayor hacinamiento de los animales
 - Efecto relamido de la zona umbilical

CONSECUENCIAS

- Mortalidad no muy importante en la época perinatal. Son más importantes otras patologías
- Aumento de las colas de las parideras, animales que quedan inválidos, claudicados y que al final se sacrifican.
- Desviejes prematuros de las reposiciones, tanto por problemas articulares, como por hernias umbilicales. En ocasiones pueden llegar al 4-5% de la reposición.